



1.



2.



3.



4.

1. Garra de Leon - 2. Lirio de Campo - 3. Pata de Guanaco  
4. Suspiro de Campo

# Desierto Florido

Región de Atacama



## Servicio Nacional de Turismo

Av. Providencia 1550, Santiago de Chile

✉ [www.sernatur.cl/contacto-general](http://www.sernatur.cl/contacto-general)

## Servicio Nacional de Turismo | Chile



*Distribución gratuita  
Prohibida su venta*

[www.chile.travel](http://www.chile.travel)  
[www.chileestuyo.cl](http://www.chileestuyo.cl)



*Prefiere Servicios Certificados*





# Desierto Florido

## Ubicación

Ubicada en los territorios del Desierto de Atacama, la Región de Atacama presenta el área de mayor presencia y ocurrencia del Desierto Florido. Básicamente corresponde a una zona de aridez y altas presiones predominantes con variables períodos de ocurrencia de precipitaciones invernales (precipitación media anual de Copiapó asciende a menos de 30mm), escasa humedad y altas temperaturas con amplias oscilaciones diarias.

Al interior de esta gran zona de desierto se pueden diferenciar zonas de desierto costero, con mayor presencia de nubosidad y camanchacas penetrando a través de valles y serranías, desierto interior y desierto marginal de altura, donde las temperaturas disminuyen y aumentan las posibilidades de precipitaciones en forma nivosa de tipo invernal.

## La Floración

Cada cierto tiempo y luego de un largo letargo, que puede ser entre 3 a 10 años, ocurren precipitaciones en el Desierto de Atacama, transformando un paisaje árido y desolado, de arenas y piedras en un verde tapiz. Nacen nuevas hojas de arbustos secos, brotan semillas, bulbos y rizomas por años guardados bajo tierra.

La floración comienza a fines de agosto cuando las precipitaciones han sido espaciadas durante mayo, junio y julio, despertando el “mecanismo de latencia” asociado a la temperatura y humedad. Esta floración puede extenderse hasta octubre, según el área geográfica de la región.

Las especies no florecen todas simultáneamente, comenzando la floración con las especies de bulbos como las Añañucas (amarillas y rojas), áreas desérticas de Vallenar y Copiapó. Sorprenden algunas especies endémicas, es decir, cuyo hábitat es solamente en esta región, y que no crecen en otro lugar del mundo. Un ejemplo es la Garra de León que crece en áreas del Parque Nacional Llanos de Challe, en la Provincia de Huasco y en quebradas aledañas a la localidad de Totoral.

### Recomendaciones

La preservación de este frágil y efímero Ecosistema implica sólo transitar por caminos y senderos establecidos, evitando pisotear las plantas y transitar sobre praderas con vehículos, no cortar ni arrancar las plantas de raíz, no extraer semillas y no botar ningún tipo de basura ni desperdicio.


Debemos resguardar este maravilloso Desierto Florido para que pueda seguir reproduciéndose, como legado para futuras generaciones con todo esplendor, colores, flora y fauna que hemos conocido hasta ahora, y que forma parte del Patrimonio Natural de Chile.

### Cuidemos el Patrimonio Natural


- ✳ **Utiliza protector solar.**
- ✳ **Realiza tu recorrido por caminos y senderos establecidos.**
- ✳ **No pises las plantas.**
- ✳ **No transites por las praderas con vehículos.**
- ✳ **No arranques las plantas de raíz.**
- ✳ **Arroja la basura y desperdicios en basureros.**

### Algunas especies del Desierto Florido


- Rhodophiala Bagnoldii sp.
- Huilli - Leucocoryne Appendiculata
- Pata De Guanaco - Calandrinia Longiscapa
- Nolana Sp.
- Oenothera Coquimbensis
- Leontochir Ovallei
- Malvilla - Cristaria Molinae
- Corona de Fraile - Encelia Canescens
- Terciopelo - Argylia Radiata
- Senecio - Myriophyllus
- Alstroemertia Kingii Phil
- Oreja de Zorro - Aristolochia Chilensis
- Copiapo - Copiapo Dealbata



RELICARIO




FLOR DEL MINERO



TE DE BURRO




TOMATILLO



VARILLA



VIOLA DEL CAMPO



AZULILLO



CARDO SANTO



COPAO



GARRA DE LEÓN AMARILLA